

Zur Moos- und Flechtenflora Nordgriechenlands

Von Patricia Geissler

Manuskript eingegangen am 30. März 1977

Ein erster Beitrag zur Kenntnis der griechischen Moosflora stammt von Copey 1907 und 1909, sieht man von der Bearbeitung der Mazzarianischen Exsikkaten aus den Ionischen Inseln durch Juratzka und Gottsche 1861 ab. Die Zusammenstellung von Copey umfasst aber nur das Staatsgebiet vor dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Auch die weiteren Publikationen von Schiffner und Baumgartner 1919, Bornmüller 1928, Baumgartner in Rechinger 1943, Froehlich in Rechinger 1961, Düll 1966, Gradstein 1970 und Zander 1974 behandeln das mittlere und südliche Griechenland, die ionischen und ägäischen Inseln oder Kreta. Nur bei Pöder 1922 und Ade und Koppé 1955 finden sich wenige Angaben aus Nordgriechenland.

Beiträge zu Flechtenflora finden sich hauptsächlich in den Veröffentlichungen von Steiner 1898 und 1919, Harmann und Maire 1909 und E. Waller 1976. Die mediterranen Geoelemente der Kryptogamenflora, die auf der Exkursion des Botanischen Instituts der Universität Basel (unter der begeisterten Leitung von Prof. H. Zoller und Prof. N. Athanasiadis) im Juli 1976 auf dem Weg auf den Olymp, ins Voralpengebirge und in die Rhodopen gesammelt wurden, sind auch alle für Griechenland bereits bekannt.

In den mösischen Buchen- und Fichtenwäldern wurden aber manche mittel-europäischen Arten an der Südostgrenze ihres Areals wohl neu für Griechenland gefunden, zumindest existieren in der in Mitteleuropa zugänglichen Literatur keine Angaben darüber. Aus diesem Grund schien es angebracht, eine Liste der beobachteten Moose und Flechten zusammenzustellen. Für den Anschluss an die gesamt-europäische Verbreitung waren die Angaben in der kürzlich erschienenen bulgarischen Moosflora von Petrov 1975 von grosser Wichtigkeit. So konnte festgestellt werden, dass das Areal mancher mitteleuropäischer Arten über die Balkangipfel bis in die Rhodopen reicht. Deshalb wird in der Moosliste nicht nur mit den Angaben aus Griechenland, sondern auch mit der Verbreitung in Bulgarien verglichen.

Bei verschiedenen variablen Gruppen, z. B. *Dicranum scoparium*, wurde auf die Bestimmung der Unterarten verzichtet, da einerseits die Zeit oft nicht ausreichte, genügend Material zu sammeln, andererseits, wie bei *Ramalina fraxinea* und verwandten Formen, die Sippen schwierig voneinander zu trennen sind. Auf-

fallend war das häufige Vorkommen von *Lophocolea minor* an den gleichen Standorten wie *L. heterophylla*. Ob diese Arten wirklich gut gegeneinander abzgrenzen sind — auch Meyle 1924 vermutet, dass beide in den gleichen Formenkreis gehören — werden künftige Untersuchungen zeigen.

In den folgenden Listen sind Standort, Fundort, Provinz, Meereshöhe und Herbarnummer in Herbarium Patricia Geissler angegeben. Nummern in Klammern bedeuten, dass der entsprechende Beleg die Art nur als Beimischung enthält. Die Angaben aus Bulgarien (B) stammen aus Peterov 1975, aus Griechenland (G) wurden die nächstgelegenen bekannten Stellen aufgeführt. Bei derselben Art wurde der Standort nicht wiederholt, wenn er für verschiedene Fundorte gleich blieb. Für die soziologischen Zusammenhänge zwischen Moos- und Flechtenvegetation und den Waldgesellschaften sei auf die Arbeit von Zoller, Geissler und Athanasiadis 1977 hingewiesen. Die Provinzbezeichnungen wurden nur bei der Insel Thasos (Prov. Kavala) und Olymp (zum grössten Teil Prov. Pieria) weggelassen. Das Gebiet des Mavri Petra im äussersten Osten der Provinz Drama untersteht wohl dem Forstamt von Xanthi.

Herrn Dr. Timo Kopponen, Helsinki, danke ich für die Bestimmung der *Plagiomnium*-Arten; Herr Dr. Klaus Ammann, Bern, war mir bei der Flechtenbestimmung behilflich und ermittelte die Inhaltsstoffe der *Cladonia*-Arten mit Dünnschichtchromatographie.

Lichenes

Alectoria implexa (Hoffm.) Nyl.

an *Picea abies*, Elatia, Drama, 1550 m, 1947

G: Parnass (Haramandet Maire), Athos (Satala)

Alectoria iubata (L.) Ach. em. Motyka

an *Fagus silvatica*, Pefkoto im Voras, Pella, 1300 m, 1904, ibidem 1500 m, (1905), an *Picea abies*, Elatia, Drama, 1550 m, 1949, an *Fagus silvatica*, ibidem, 1530 m, 1997

G: Parnass (Haramandet Maire), Athos (Satala)

Anaptychia ciliaris (L.) Koerber

an *Fagus silvatica*, Pefkoto, Pella, 1500 m, (1905), c. ap. Elatia, Drama, 1530 m, 1996, an *Quercus dalechampii*, c. ap. Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2038, Melissa NW Alexandroupolis, Evros, 420 m, (2058), ibidem 440 m, (2061), an *Abies cephalonica*, Mainolon ob Vytina, Peloponnes, 1000 m, leg. H. Zoller IPE 1971

G: Pelion (Haramandet Maire), Athos (Satala)

Baeomyces cf. rufus (Huds.) Rebent.

Piceastrunk, Elatia, Drama, 1380 m, 1956

Cladonia chlorophaea s. l., mit Fumarprotocetrarsäure

Erdboden in Flaumeichenwald, ob Promachi, NW Aridea, Pella, 560 m, 1890

G: Pelion (Haramandet Maire), Athos (Satala)

Cladonia coniocraea (Flk.) Vain. mit Fumarprotocetrarsäure

Fagusstrunk, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, 1899

G: Athos (S z a t a l a)

Cladonia convoluta (Lam.) P. Cout.

Pinus brutia-Wald, Diavolorema, N Alexandroupolis, Evros, 100 m

G: Pindus (H a r m a n d e t M a i r e), Athos, Parnass (S z a t a l a)

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. mit Fumarprotocetrarsäure und Protocetrarsäure

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1935

G: Ossa (H a r m a n d e t M a i r e), Athos (S z a t a l a)

Cladonia klementii Oxn. (= *C. aberrans* [des Abb.] Klem.) mit Atranorin, Rangiformsäure, Norrangiformsäure, Fumarprotocetrarsäure

Quercus dalechampii — Wald, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2 050

Pinus brutia — Wald, Diavolorema, N Alexandroupolis, Evros, 110 m, 2 070

Cladonia subrangiformis Sandstede mit Atranorin, Fumarprotocetrarsäure

offene Stelle in degradiertem Buchenwald, Pefkoto, Voras, Pella, 1 330 m, 1 892

Für Arten aus der *furcata*-Gruppe gibt es mehrere Fundortsangaben aus Griechenland

Evernia divaricata (L.) Ach.

an *Fagus silvatica*, Oxya-Amarantou, Pindus, 1 300 m, leg. H. Zoller auf der IPE 1971

G: Giona (H a r m a n d e t M a i r e)

Evernia prunastri (L.) Ach.

an *Picea abies*, Elatia, Drama 1550 m, 1945, an *Fagus*, ibidem, 1530 m, 1998, an *Pinus brutia*, Ipsarion oros, Thasos, 650 m, (2024), an *Quercus dalechampii*, Kallithea N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2003, Melissa, NW Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2056

G: Euboea, Athos (S z a t a l a)

Graphis scripta (L.) Ach.

an *Fagus silvatica*, Sagradenia N Paranestion, Drama, 1550 m, 2007

Hypogymnia intestiniformis (Vill.) Räs.

Granitfelsen, c. ap. Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, 1920

B: Rila (P o d p ě r a)

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

an *Picea abies*, Elatia, Drama, 1550 m, (1947), an *Quercus dalechampii*, Kallithea N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2033

G: Athos (S z a t a l a)

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.

an *Pinus brutia*, Ipsarion oros, Thasos, 650 m, 2024

G: Samos (S z a t a l a)

Lecanora subfuscata s.l. c. ap.

an *Fagus silvatica*, Sagradenia, Drama, 1500 m, 2006, an *Quercus dalechampii* Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2035
G: Pelion (H a r m a n d e t M a i r e), Athos (S z a t a l a)

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

an *Fagus silvatica*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1887, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, (2034)
G: Athos, Euboea (S z a t a l a)

Lobaria scrobiculata (Scop) DC

an *Fagus silvatica*, Stiarpa-Dokimi, Pindus, 1800 m, leg. H. Zoller, IPE 1971
G: Athos (S z a t a l a)

Nephroma laevigata Ach.

an *Fagus silvatica*, Stiarpa-Dokimi, Pindus, 1800 m, an *Abies cephalonica*, Chrysovitsi ob Vytina, Peloponnes, beide leg. H. Zoller, IPE 1971

Nephroma resupinatum (L.) Ach. c. ap.

Vulkanischer Blockschnitt, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1620 m, 1889
Fagusstrunk, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, 1906
G: Oxya-Amarantou, Pindus (W a l t e r)

Parmelia acetabulum (Neck.) Duby c. ap.

an *Quercus dalechampii*, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m (2033)
Melissa, NW Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2059
G: Athos (S z a t a l a)

Parmelia caperata (L.) Ach.

an *Quercus dalechampii*, Melissa, NW Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2059
ibidem 560 m, 2060
G: Athos (S z a t a l a)

Parmelia conspersa Ach. c. ap.

Silikatstein in *Quercus dalechampii*-Wald, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2032, in *Pinus brutia* Wald, Diavolorema, N Alexandroupolis, Evros, 80 m, 2069
G: Pindus (H a r m a n d e t M a i r e), Samothrake, Athos (S z a t a l a)

Parmelia fuliginosa (Fr.) Nyl.

an *Fagus silvatica*, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2034
G: Athos, (S z a t a l a)

Parmelia pulla Ach. c. ap.

Pinus brutia-Wald, Diavolorema, N Alexandroupolis, Evros, 80 m, 2068

Parmelia scortea Ach. c. ap.

an *Quercus dalechampii* Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2058
G; Oita (H a r m a n d e t M a i r e), Tenos, Naxos, Athos (S z a t a l a)

Parmelia sulcata Th. Tayl.

an *Fagus silvatica*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, (2113), Granitfel-

sen Lailia, Serrai, 1360 m, 1919, an *Quercus dalechampii* c. ap., Melissa, NW Alexandroupolis, 440 m, 2061
G: Limnos, Athos (S z a t a l a)

Parmeliella plumbea Müll. Arg. c. ap.

an *Abies cephalonica*, Chrysovitsi, Vytina Peloponnes, 1100 m, leg. H. Zoller IPE 1971
G: Rhodos (S z a t a l a)

Peltigera aphthosa (L.) Willd. c. ap.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, ibidem, 1360 m, 1943
G: Ossa (H a r m a n d e t M a i r e)

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. c. ap.

Quercus dalechampii-Wald, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, (2101) *Abies cephalonica*-Wald, Chrysovitsi, Vytina, Peloponnes, 1100 m, leg. H. Zoller, IPE 1971
G: Pelion, (H a r m a n d e t M a i r e), Athos (S z a t a l a)

Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm. c. ap.

Felsen in Fichtenwald, Elatia, Drama, 1360m, 1942, Kalkfels in Tilio-Casta-netum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, 400 m, 1934
G: Athos (S z a t a l a)

Peltigera venosa (L.) Baumg.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1360 m, leg. H. Zoller

Pertusaria albescens (Huds.) Choisy

Quercus ilex, Prinos, Thasos, 300 m, 2023

Pertusaria amara (Ach.) Nyl.

an *Fagus silvatica*, Sagadenia, Drama, 1550 m, 2005, an *Quercus dalechampii*, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2037, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2062
G: Athos (S z a t a l a)

Pertusaria hymenea (Ach.) Schaeer. c. ap.

an *Quercus dalechampii*, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2051
G: Epirus (H a r m a n d e t M a i r e), Athos (S z a t a l a)

Physcia stellaris (L.) Nyl. c. ap.

an *Quercus dalechampii*, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2052
G: Pelion (H a r m a n d e t M a i r e), Athos (S z a t a l a)

Physconia pulverulenta (Schreb.) Poelt c. ap.

an *Fagus silvatica*, Elatia, Drama, 1530 m, 2004, an *Quercus ilex*, Prinos, Thasos, 300 m, 2022, an *Quercus dalechampii*, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2036
G: Athos, Skyros, Euboea, (S z a t a l a)

Physconia venusta (Ach.) Poelt c. ap.

an *Quercus dalechampii*, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2054,

Diavolorema, N Alexandroupolis, 110 m,
G: Athos (S z a t a l a)

Platismatia glauca (L.) Culb. et Culb.

an *Fagus silvatica*, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1300 m, 2116 C. ap., Sagradeinia, Drama 1580 m, 2008, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2034, an *Pinus brutia* c. ap., Ipsarion oros, Thasos, 650 m, 2024, c. ap.

G: Athos (S z a t a l a)

Protoblastenia russula (Ach.) Räs. c. ap.

an *Quercus dalechampii*, Diavolorema, N Alexandroupolis, Evros, 110 m, 2115 leg. H. Zoller

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

var. *furfuracea*

an *Picea abies*, Elatia, Drama, 1550 m, (1950), an *Fagus silvatica*, ibidem 1530 m (2001)

var. *olivetorina* Poelt

an *Pinus brutia*, Ipsarion oros, Thasos, 650 m, 2123

G: Samothrake, Athos (S z a t a l a)

Ramalina calicaris (L.) Fr. c. ap.

an *Fagus silvatica*, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, 1902, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, (2039), an *Quercus dalechampii*, Melissa, N Alexandroupolis, 440 m, 2055

G: Athos (S z a t a l a)

Ramalina carpatica Koerb. steril

vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1620 m, 1886

B: Vitosha planina 2200 m, (Nordungarn, Siebenbürgen, Bukowina) (P o d - p ě r a)

Ramalina farinacea (L.) Ach.

an *Fagus silvatica*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, (2112), Pefkoto, Voras, 1500 m, 1900, Elatia, Drama, 1530 m, 2001, an *Abies borisii-regis*, ibidem 1550 m, 1946, an *Fagus*, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2041 an *Quercus dalechampii*, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 440 m,

G: Athos (S z a t a l a)

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. c. ap.

an *Fagus silvatica*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 2112, Pefkoto, N Aridea Pella, 1500 m, (1902), Elatia, Drama, 1530 m, (1944), Mavri Petra, N Stravroupolis, Drama, 1400 m, 2039, an *Quercus dalechampii*, Melissa, NW Alexandroupolis, Evros, 440 m, (2055)

G: Naxos, Athos (S z a t a l a)

Ramalina fraxinea (L.) Ach. c. ap.

an *Fagus silvatica*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1885, Elatia, Drama 1530 m, 1944, an *Quercus dalechampii*, Kallithea, N Stavroupolis,

Xanthi, 870 m, 2040 m, *Melissa*, N *Alexandroupolis*, *Evros*, 420 m, 2057
G: Arkanien, (H a r m a n d e t M a i r e)

Ramalina pollinaria (Ach.) Ach.

an *Fagus silvatica*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 2113, Pefkoto, N Aridea, 1500 m, 1900, Granitfelsen, Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, 1921 an *Fagus silvatica*, Elatia Drama, 1390 m, 2002,
G: Thira, (S t e i n e r)

Solorina bispora Nyl. var. *macrospora* (Harm.) Oliv. c. ap. Sporen 55 x 120 μ
Balm, Olymp, Pieria, 1950 m, (1965)
G: *S. saccata*: Parnass, 2400 m, (H a r m a n d e t M a i r e)

Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey c. ap.

vulkanischer Fels, Anopeternik NW Aridea, Pella, 1630 m, 1888

Usnea sp.

an *Fagus silvatica*, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1300 m, 1903, ibidem, 1500 m, 1905, an *Picea abies*, Elatia, Drama 1550 m, 1948, an *Fagus silvatica*, c. ap. ibidem, 1530 m, 1999

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. c. ap.

an *Quercus dalechampii*, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2033
Melissa, N *Alexandroupolis*, *Evros*, 420 m,
G: Athos, (S z a t a l a)

HEPATICAE

Barbilophozia barbata (Schmid.) Loeske

Vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1550 m, (1874)
B: Gebirge Nordbulgariens, G: Pelion (C o p p e y), Samothrake (B a u m - g a r t n e r)

Barbilophozia hatcheri (Ev.) Loeske

Granitfels, Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, (1974)
B: Stara, Vitoša, Rila, Nordrhodopen, G: Euboea (F r o e h l i c h),
Samothrake (B a u m g a r t n e r)

Blasia pusilla L.

Bachrand, Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1931, Quelliger Hang,
Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2065
B: verbreitet

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum.

Abiesfaulholz, Sagradenia, Drama, 1580 m, (2044)
B: Stara, Vitoša, Rila, Pirin, Rhodopen

Cephalozia catenulata (Hueb.) Lindb. c. per.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1380 m, 2009; Abiesfaulholz, Sagradenia, Drama, 1580 m, (2043)
B: Vitoša, Rila

Cephalozia lunulifolia (Dum) Dum. = *C. media* Lindb. c. per.

Abiesfaulholz, Sagadenia, Drama, 1670 m, 2031

B: Pirin

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda

Lunario-Acerion, Osthang des Thessalischen Olymp, 600 m, 1953; Galio—odorati-Fagion, ibidem, 1500 m, 1860

B: verbreitet, G: Pelion (C o p p e y), Olymp (A d e und K o p p e)

Conocephalum conicum (L.) Dum.

an Bach in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1977; Quelliger Hang, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2044

B: verbreitet, G: Pindus (C o p p e y), Olymp, (A d e und K o p p e)

Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.

Die Archegonstände entwickelten sich in Kultur im Botanischen Garten Basel

Coccifero-Quercetum, W Stavros, Chalkidike, 10 m, Kultiviert in Basel

B: Kavarna, Stranča, G: Athos (P o d p ě r a)

Frullania dilatata (L.) Dum.

an *Fagus sylvatica*, Osthang des Olymp, 950 m, (1964); c. per. Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, (1873); Pefkoto, N Aridea, 1500 m, (1914); Kalkfels, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, (1976); an *Fagus sylvatica*, c. sp. Elatia, Drama, 1390 m, 2026; an *Quercus pedunculiflora*, Periploco-Ulmetum, Chrysopolis, Kavala, 10 m, (2086); an *Quercus dalechampii*, c. per. Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, (2071); Stein, c. sp. ibidem, (2090) an *Quercus dalechampii* Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, (2056); an *Quercus conferta*, c. per. Diavolorema, N Alexandroupolis, 110 m, 2107

B: verbreitet, G: Pelion (C o p p e y), Athos (P o d p ě r a), Olymp (A d e und K o p p e)

Jungermannia hyalina Lyell ex Hook. = *Plectocolea hyalina* (Lyell) Mitten

nasser Kalkfelsen, c. per. Osthang des Olymp, 1200 m, 1866

B: verbreitet, G: Peloponnes, (B o r y in Coppey)

Jungermannia leiantha Grolle = *J. lanceolata* auct.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1380 m, 2021

B: Stara, Vitoša, Rila, G: Korfu (K. M ü l l e r in Rabenhorsts Kryptogamenflora)

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

über *Homomallium incurvatum* an Kalkfelsen in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1976; ausgetrocknetes Bachbett, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, (2103)

B: verbreitet in höheren Lagen, G: Kriti, (G r a d s t e i n)

Lepidozia reptans (L.) Dum.

Faulholz, Elatia, Drama, 1370 m,

B: Stara, Vitoša, Rila, Rodopite

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum.

Kalkfelsen in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, (1981); Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1550 m, (1991); 1360 m, (2009); Abiesfaulholz, Sagadenia, Drama, 1670 m, 2044; morscher Fagus-strunk, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2098, B: im Gebirge Westbulgariens, G: Athos (Müller in Rabenhorsts Kryptogamenflora)

Lophocolea minor Nees

Cardamino-Fagion, Osthang des Olymp, 950 m, (1962); Gebirgssteppe, Olymp, 2200 m, (1855); Erdrain in Luzulo-Fagion, Lailia, Serrai, 1360 m, (1917); Faulholz, ibidem, (1923); Piceafaulholz, Elatia Drama, 1550 m, 1992; 1360 m, (2009)

B: verbreitet, G: Pindus (Copphey)

Lophozia collaris (Nees) Dum. = *Leiocolea muelleri* (Nees) Jörg.

Gebirgssteppe, Olymp, 2200 m, (1885); Galio-odorati-Fagion, ibidem, 1500 m, 1859

B: Stara, Pirin, Westrhodopen, G: Thessalien (Ade und Koppe)

Lophozia incisa (Schrad.) Dum.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1380 m, 1995

B: Rila, Pirin, West- und Zentralrhodopen

Lophozia obtusa (Lindb.) Evans

Erdrain in Luzulo-Fagion, Lailia, Serrai, 1360 m, 1917; Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1994; 1380 m, (2010)

B: Stara, Vitoša, Rila, Pirin, Bjelasiza, Rodopite

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1380 m, (1995); Abiesfaulholz, Sagadenia, Drama, 1670 m, 2029

B: Westbulgarien

Madotheca cordaeana (Hueb.) Dum. = *Porella cordaeana* (Hueb.) Moore

Vulkanische Felsen in Bachbett, Anopeternik, Voras, Pella, 1400 m, 1891; ausgetrocknetes Bachbett, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2103

B: im Gebirge verbreitet, G: Ossa, Pindus (Copphey), Korthiathi (Podadera) Samothrake (Ade und Koppe)

Marchantia polymorpha L.

Nasswiese, Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1932; Elatia, Drama, 1360 m, 2014, Coccifero-Quercetum, W Stavros, Chalkidike, 10 m, kultiviert in Basel

B: verbreitet, G: Pindus, Pelion (Copphey), Samothrake (Ade und Koppe)

Marsupella funckii (Web. et. Mohr) Dum.

Granitfelsen, Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, 1973

B: Stara, G: Ossa (Copphey)

Metzgeria furcata (L.) Dum.

Silikatblock in Luzulo-Fagion, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1881; in Luzulo-Fagion mit *Pinus peuce*, Katopeternik, NW Aridea, 1550 m (1878); Stein in Luzulo-Fagion, Pefkoto, 1500 m, (1913); Faulholz, Lailia, Serrai, 1360 m, (1923); Granitfels, Alibaba, Lailia, 1800 m, (1974); an *Fagus silvatica*, Sagradenia, Drama, 1580 m, (2030); Mavripetra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, (2094); ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2106;

B: im Gebirge verbreitet, G: Kriti (G r a d s t e i n)

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1380 m, 2025; Abiesfaulholz, Sagradenia, Drama, 1670 m, 2042

B: Stara, Vitoša, Ossogovo, Rila, Westrhodopen

Plagiochila asplenoides Dum.

Balm, Osthang des Olymp, 1950 m, (1966); Stein in Luzulo-Fagion, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, (1913); Nasswiese, Elatia, Drama, 1360 m, 2020

B: verbreitet, G: Pindus, Ossa, (C o p p e y), Olymp, (A d e und K o p p e) Korthiathi (P o d p ě r a)

Radula complanata (L.) Dum. häufig mit Brutkörpern

an *Fagus silvatica*, Osthang des Olymp, 970 m, (1964); Kryovrissi, c. per. NW Aridea, Pella, 1030 m, 1875; Pefkoto, N Aridea, 1300 m, (1909); Kalkfels in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarachai und Livaderon, Drama, 400 m, (1976); Felsen, Elatia, Drama, 1360 m, (2012); an *Quercus pedunculiflora*, Periploco-Ulmetum, Chrysoupoulis, Kavala, 10 m, (2086); an *Clematis vitalba*, ibidem, (2087); an *Ulmus minor*, ibidem, (2088); an *Quercus dalechampii*, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, (2071); Stein, ibidem, (2090); ausgetrockneter Bach, c. per. Melissa, NW Alexandroupolis, Avros, 560 m, (2103)

B: verbreitet, G: Ossa, (C o p p e y) Athos (P o d p ě r a), Olymp, Samothrake (A d e und K o p p e)

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi

Balm, Olymp, 1950 m, 1965

B: verbreitet, G: Thessalien (C o p p e y)

Riccardia latifrons Lindb.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1380 m, (2009)

B: verbreitet,

Scapania curta (Mart.) Dum.

Blockhalde, Olymp, 2300 m, 1854

B: Stara, Rila, Vitoša, Pirin, Rhodopen, G: Ossa (C o p p e y)

Scapania undulata (L.) Dum.

Bach, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1400 m, (1891); Bach, Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1933

B: verbreitet, G: Peloponnes (B o r y in Coppey)

Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn.

Felsen in Luzulo-Fagion, Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1937

B: Rila

MUSCI

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1985

B: verbreitet

Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske

an *Fagus silvatica*, c. sp. Osthang des Olymp, 960 m, 1963, Pefkoto, c. sp., N Aridea, Pella, 1300 m, 1908; Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2094

B: Stara, Vitoša, Rila, Pirin, Westrhodopen

Amblystegium serpens (Hedw.) B. S. G.

ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2103

B: verbreitet, G: Böotien (S i b t h o r p e t S m i t h in Coppey)

Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.

morscher Buchenstrunk, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2097

B: Isker

Anisothecium rufescens (With.) Lindb.

Erdrain in Luzulo-Fagion, c. sp. Lailia, Serrai, 1360 m, 1922

B: Rodopite, Pjesčera G: Kriti (D ü 11)

Anisothecium varium (Hedw.) Mitt.

Nasswiese, c. sp. Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360, 1936

B: Südbulgarien, G: Euboea (U n g e r in Coppey)

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.

Kalkfels in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, (1981)

B: verbreitet, G: Thessaloniki (P o d p ě r a), Olymp (A d e und K o p p e)

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

an *Fagus silvatica*, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1300 m, 1909

B: im Gebirge, G: Euboea (F r o e h l i c h)

Atrichum undulatum (Hedw.) P. B.

Fichtenwald, Elatia, Drama 1360 m, 2013

B: verbreitet, G: Ossa (C o p p e y), Thessaloniki (P o d p ě r a)

Aulacomnium palustre Schwaegr.

Flachmoor, Lailia, Serrai, 1360 m, 1940, Pertouli, Pindus, 1100 m, leg. H. Zoller IPE 1971

B: im Gebirge verbreitet

Barbula fallax Hedw.

Balm, Olymp, 1950 m, 1967

B: verbreitet, G: Athos (P o d p ě r a)

Barbula unguiculata Hedw.

Erdrain, c. sp. Osthang des Olymp, 690 m, (1958); Gebirgssteppe, c. sp. Olymp, 2200 m, (1853); offene Stelle in Buchenwald, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1330 m, (1897); in Tilio-Castanetum, c. sp. zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1982

B: verbreitet, G: Attika (C o p p e y)

Bartramia ithyphylla Brid.

Granitfels, c. sp. Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, 1971; Picea-faulholz, Elatia, Drama, 1380 m, 2009

B: verbreitet, G: Samothrake (B a u m g a r t n e r, A d e und K o p p e)

Bartramia pomiformis Hedw.

Erdrain in Luzulo-Fagion, c. sp. Lailia, Serrai, 1360 m, 1918

B: verbreitet, G: Ossa (C o p p e y)

Bartramia stricta Brid.

Rohhumus, Osthang des Olymp, 950 m, 2120

G: Thessaloniki (A d e und K o p p e)

Brachythecium glareosum (Spruce) B. S. G.

Balm, Olymp, 1950 m, (1967), Gebirgssteppe, Olymp, 2200 m, 1856; offene Stelle in Buchenwald, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1330 m, (1898); Basis einer *Fagus silvatica*, Pefkoto, 1300 m, 1910

B: verbreitet, G: Kriti, (B a u m g a r t n e r, D ü l l)

Brachythecium populeum (Hedw.) B. S. G.

an *Fagus silvatica*, c. sp. Osthang des Olymp, 960 m, (1963); Katopeternik, NW Aridea, Pella, 1550 m, 1878; an *Quercus dalechampii*, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, (2099); 560 m (2101)

B: verbreitet,

Brachythecium rivulare B. S. G.

Bach, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1400 m, 1895, Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1928, Bach in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1978, ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, (2102)

B: verbreitet, G: Delphi (C o p p e y)

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B. S. G.

Galio-odorati-Fagion, Osthang des Olymp, 1500 m, 1861; Kalkfelsen in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1980;

Quercus dalechampii-Wald, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2101

B: verbreitet, G: Ossa (C o p p e y), Thessaloniki (P o d p ě r a) Olymp (A d e und K o p p e)

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1983; an *Ulmus minor*, Chrysoupolis,

Kavala, 10 m, 2088; morscher Fagusstrunk, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2095

B: verbreitet

Brachythecium trachypodium (Brid.) B. S. G.

Gebirgssteppe, Olymp, 2100 m, 1855

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa, Algerien, Kaukasus

Brachythecium velutinum (Hedw.) B. S. G.

Erdrain, c. sp. Osthang des Olymp, 950 m, (1960); an *Fagus silvatica*, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1300 m, (1910); Fagusstrunk, c. sp. Pefkoto, 1500 m, 1912; Erdrain, Lailia, Serrai, 1360 m, (1918); Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1550 m, 1988; 1380 m, (1995); an *Clematis vitalba*, c. sp. Chrysoupolis, Kavala, 10 m, (2087); an *Ulmus minor*, ibidem, (2088); morscher Fagusstrunk, c. sp., Mavri Petra, N Stravroupolis, Drama, 1400 m, (2097)

B: verbreitet, G: Thessaloniki, Athos, (P o d p ē r a), Olymp, (A d e und K o p p e)

Bryum alpinum Huds. ex. With.

Trockenhang in Buchenwald, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1330 m, 1898

B: verbreitet, G: Samothrake (B a u m g a r t n e r, A d e und K o p p e)

Bryum cf. caespiticium Hedw.

Kalkschutthalde, Olymp, 2500 m, 1851

B: verbreitet, G: Pelion (C o p p e y), Korthiathi, (P o d p ē r a)

Bryum capillare Hedw.

Erdrain, c. sp. Osthang des Olymp, 950 m, 1960; 1950 m, (1967); Vulkanscher Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1550 m, (1876); Rain, Lailia, Serrai, 1360 m, (1922); Piceafaulholz, c. sp. Elatia, Drama, 1550 m, (1983, 1888)

B: verbreitet, G: Athos (P o d p ē r a), Olymp, (A d e und K o p p e)

Bryum cf. murorum (Schimp.) Berk.

Schuttflur, Olymp, 1800 m, 1858,

B: Südwestbulgarien, G: Karpathos (B a u m g a r t n e r)

Bryum pallescens Schwaegr. c. sp.

Nasswiese, Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1929; Granitfelsspalte, Alibaba, Lailia, 1800 m, (1971)

B: Vitoša, Rila, Westrhodopen, G: ohne Ortsangaben K i n d b e r g in Coppey

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr.

Bach, Osthang des Olymp, 1100 m, 2000; Quelliger Hang, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2065

B: verbreitet, G: Pindus, Pelion, (C o p p e y), Athos (P o d p ē r a)

Buxbaumia viridis (Cand.) Moug. et Nestl. c. sp.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1380 m, 2010

B: Vitoša, Pirin, Rila, Slavianka, Zentralrhodopen

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Feuchter Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1983; 1360 m, 2018

B: verbreitet, G: Pindus (C o p p e y)

Camptothecium lutescens (Hedw.) B. S. G. c. sp.

Kalkfels, Osthang des Olymp, 1200 m, 1865

B: verbreitet, G: Thessaloniki, Athos (P o d p ē r a)

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

Flaumeichenwald, c. sp. NW Aridea, Pella, 550 m, 1870; Rain, Pefkoto, N Aridea, 1330 m, (1897); Stein in Föhrenwald, Lailia, Serrai, 1360 m, 1915; Granitfelsspalte, Alibaba, Lailia, 1800 m, (1973)

B: verbreitet, G: Ossa, Pelion, (C o p p e y), Samothrake (A d e und K o p p e)

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. B.

ausgetrockneter Bach, Osthang des Olymp, 1100 m, 1867

B: zerstreut, G: Samothrake (B a u m g a r t n e r), Olymp (A d e und K o p p e)

Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske et Fleischer

Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, 1950; Cardamino-Fagion, ibidem, 950 m, 1962; Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1979; vermoderndes Piceaholz, Elatia, Drama, 1550 m, 1986
B: Stara, Stranča, G: Thessaloniki, Athos (P o d p ē r a), Olymp (A d e und K o p p e)

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr

Flachmoor, Lailia, Serrai, 1360 m, (1929); 1450 m, 1939; feuchtes Piceetum Elatia, Drama, 1550 m, 1885

B: im Gebirge verbreitet,

Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth

Bach, Osthang des Olymp, 1100 m, 1968; Quelliger Hang, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2048

B: verbreitet, G: Pelion, Pindus, (C o p p e y), Athos (P o d p ē r a) Olymp (A d e und K o p p e)

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce

Bach, Osthang des Olymp, 1100 m, 1868; Quelliger Hang, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2048

B: verbreitet, G: Athos, (P o d p ē r a), Olymp (A d e und K o p p e)

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, (1951, 1953); Galio-odorati-Fagion, ibidem, 1500 m, (1862)

B: im Gebirge verbreitet, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Dicranum fuscescens Turn.

Fagusstrunk, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, 2118

B: Vitoša, Rila, Pirin

Dicranum scoparium Hedw.

Galio-odorati-Fagion, Osthang des Olymp, 1500 m, (1864), Luzulo-Fagion, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, (1872); Vulkanischer Fels, c. sp. Anopeternik, NW Aridea, 1600 m, 1874; Faulholz, c. sp. Lailia, Serrai, 1360 m, (1937); Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, (1983); c. sp. 1360 m, (2016); Abiesfaulholz, c. sp. Sagradenia, Drama, 1580 m, (2044); Morsche Buche, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, (2096); an *Quercus dalechampii*, c. sp. Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2100
B: verbreitet, G: Pindus, Ossa, in verschiedenen Varietäten (Coppey), Korthiathi, Athos (Podpera), Samothrake (Ade und Koppe)

Dicranum tauricum Sapehin = *Orthodicranum strictum* (Schleich) Culm.

Föhrenstrunk, c. sp. Lailia, Serrai, 1360 m, 1926; Abiesfaulholz, Sagradenia, Drama, 1670 m, 2043
B: Vitosha, Rila, Pirin, Zentralrhodopen, G: Thessalien, (Kindberg in Coppey)

Didymodon rigidulus Hedw. c. sp.

Gebirgssteppe, Olymp, 2200 m, 1853
B: verbreitet, G: Thessaloniki (Podpera)

Distichium capillaceum (Hedwig) B. S. G. c. sp.

Galio-odorati-Fagion, Osthang des Olymp, 1500 m, 2119
B: Stara, Vitoša, Rila, Pirin, Rhodopen, G: Olymp (Ade und Koppe)

Districhium flexicaule (Schwaegr.) Hampe

Quelliger Hang, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2064
B: verbreitet, G: Olymp, (Ade und Koppe)

Drepanocladus exannulatus (B. S. G.) Warnst.

Flachmoor, Lailia, Serrai, 1360 m, 1969
B: im Gebirge, G: fossil in Pertouli (Athanasiadis 1975 in Flora 164, S. 112)

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1987
B: Stara, Vitoša, Rila, West- und Zentralrhodopen, G: Andros (Kindberg in Coppey)

Encalypta ciliata Hedw. c. sp.

Vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1550 m, 1876
B: verbreitet im Gebirge

Encalypta streptocarpa Hedw.

Balm, Olymp 1950 m, (1966); Schutthalde, ibidem, 2500 m, 1849; 1500 m, 1863;
B: verbreitet, G: Pindus (Coppey), Korthiathi (Podpera), Olymp (Ade und Koppe)

Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1360 m, 2015; 1550 m, (1993)
B: Stara, Pirin, Rila, Zentralrhodopen

Eurychium pulchellum (Hedw.) Jenn. var. *diversifolium* (B. S. G.) C. Jens.
Cardamino-Fagion, c. sp. Osthang des Olymp, 960 m, (1963); Fagusstrunk, c. sp. Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1871; Granitfelsen, Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, (1974); vermoderndes Fichtenholz, Elatia, Drama, 1550 m, 1993; c. sp., 1360 m, 2016
B: im Gebirge, G: in den Gebirgen Griechenlands (H e r z o g 1926 in Geographie der Moose)

Fissidens adiantoides Hedw.

Kalkschuttflur mit *Pinus leucodermis*, Osthang des Olymp, 1800 m, 1857
B: im Gebirge verbreitet, G: Achaia, (C o p p e y)

Fissidens cristatus Mitten

Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, (1951); Stein in Buchenwald Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, (1913)
B: verbreitet, G: Karpathos (B a u m g a r t n e r), Olymp, (A d e und K o p - p e)

Fontinalis antipyretica Hedw.

Bach Marmarovrissi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1927; Elatia, Drama, 1360 m, 1999; ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, (2102); Bach, Diavolorema, N Alexandroupolis, 70 m, (2110)
B: verbreitet, G: Pelion, (C o p p e y), Samothrake (B a u m g a r t n e r, A d e und K o p p e)

Funaria muhlenbergii Turn. s. str., c. sp., cf. Crundwell and Nyholm 1974
Kalkschutthalde, Osthang des Olymp, 2000 m, 1852

Grimmia commutata (Hedw.) Sm. c. sp.

Vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1580 m, 1882; Stein in *Quercus dalechampii*-Wald, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, (2092)
B: verbreitet, G: Samothrake (A d e und K o p p e)

Grimmia montana B. S. G. c. sp.

Granitfelsen, Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, 1970
B: Rila, Pirin, G: Samothrake (A d e und K o p p e)

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Kalkfels, c. sp. in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1979; Stein in *Pinus brutia*-Wald, Diavolorema, N Alexandroupolis, 100 m, 2109
B: verbreitet, G: Pelion (C o p p e y), Athos (P o d p ē r a)

Grimmia trichophylla Grev. c. sp.

Stein in *Quercus dalechampii*-Wald, Kallithea, N Stravroupolis, Xanthi, 870 m, 2092
B: Vitoša, Pirin, Zentralrhodopen, G: Pelion (C o p p e y), Athos (P o d p ē - r a)

Gymnostomum aeruginosum Sm.

Balm, Olymp, 1950 m, 1967; Kalkschuttflur, Olymp, 2200 m, (1853)
B: Stara, Pirin, Rodopite, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Gymnostomum calcareum Nees et Hornsch.

Kalkfels in Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, 1952

B: Bulčiško, Sofia, Zentralrhodopen, G: Akarnanien, Attika (C o p p e y)

Habrodon perpusillus (DeNot) Lindb.

an *Abies cephalonica*, Chrysovitsi, Vytina, Peloponnes, 1100 m, leg. H. Zoller
IPE 1971

G: Epirus (B r e i d l e r in Coppey)

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. B. c. sp.

Stein in *Quercus dalechampii*-Wald, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi,
870 m, 2089

B: verbreitet, G: Athos (P o d p ē r a), Thessalien (C o p p e y)

Homalothecium sericeum (Hedw.) B. S. G.

Stein in Cephalanthero-Fagion, Osthang des Olymp, 700 m, 1959; Galio-
odorati-Fagion, ibidem, 1500 m, 1863

B: verbreitet, G: Pindus, Pelion (C o p p e y), Thessaloniki, Athos (P o d p ē -
r a), Samothrake (B a u m g a r t n e r), Olymp (A d e und K o p p e)

Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske

Trockenhang, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1330 m, 1907; Tilio-Castanetum,
zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1976

B: Vitoša, Rila, Pirin, Stranča, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Brown c. sp.

Rain, Osthang des Olymp, 690 m, 1958

B: verbreitet, G: Korthiathi (P o d p ē r a)

Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1360 m; 1550 m, 1985

B: im Gebirge, G: Korfu (J u r a t z k a)

Hypnum cupressiforme Hedwig

Rain, Lailia, Serrai, 1360 m, (1918); Stein ibidem, (1937); Tilio-Castanetum,
zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, (1981); Piceetum, Elatia,
Drama, 1550 m, 1983; *Abies faulholz*, c. sp. Sagradenia, Drama, 1580 m,
(2044); an *Quercus pedunculiflora*, Chrysopolis, Kavala, 10 m, (2086); an
Clematis vitalba, ibidem, (2087); Stein Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi,
870 m, (2091); morsche Buche, Mavripetra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m,
(2095);

B: verbreitet, G: Athos (P o d p ē r a), Olymp (A d e und K o p p e) etc.

var. *ericetorum* B. S. G.

Faguswurzel, c. sp. in Cephalanthero-Fagion, Osthang des Olymp, 690 m,
1957; *Quercus dalechampii*-Wald, c. sp. Melissa N Alexandroupolis, Evros,
560 m, 2101

G: Athos, (P o d p ē r a)

Isothecium myurum Brid.

Block, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1880 m; Pefkoto, N Aridea,
1500 m, (1913); Fichtenwald, Elatia, Drama, 1360 m, 2016; an *Fagus silva-*
tica, Sagradenia, Drama 1580 m, 2030; ausgetrockneter Bach, Melissa, N

Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2103

B: verbreitet, G: Ossa (C o p p e y), Thessaloniki (P o d p ě r a), Samothrake (B a u m g a r t n e r)

Leptodon smithii (Hedw.) Web. et Mohr

an *Quercus pubescens*, Prinos, Thasos, 300 m, 2045

B: Stara, Südbulgarien, G: Athos (P o d p ě r a)

Lescuraea incurvata (Hedw.) Lawt.

Silikatblock, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1872; Pefkoto, N Aridea, 1500 m, 1913; Granitfels, Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, 1972; Luzulo-Fagion, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2114;

B: Vitoša, Rila, Pirin, Rhodopen, G: Pindus (C o p p e y)

Lescuraea saviana (DeNot.) Lawt.

an *Fagus silvatica*, Sagradenia, Drama, 1580 m, 2030

B: Vitoša, Rhodopen, Bjelasiza

Lescuraea saxicola (B. S. G.) Milde

Felsen in Piceetum, Elatia, Drama, 1360 m, 2012

B: Vitoša, Rila, G: Euboea, (F r o e h l i c h)

Lescuraea striata (Schwaegr.) B. S. G.

Faulholz, Lailia, Serrai, 1360 m, 1923

B: Vitoša, Pirin

Leskea polycarpa Ehrh. ap. Hedw.

an *Clematis vitalba*, Periploco-Ulmetum, Chrysopolis, Kavala, 10 m, 2086;

an *Quercus pedunculiflora*, ibidem, 2087; an *Ulmus minor*, c. sp. ibidem, 2088

B: verbreitet

Leucodon sciroides (Hedw.) Schwaegr.

an *Fagus silvatica*, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, 1914; Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2094; an *Quercus dalechampii*, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 420 m, 2099

B: verbreitet, G: Pindus, Pelion (C o p p e y), Thessaloniki, Athos (P o d p ě r a)

Mniobryum wahlenbergii (Web. et Mohr) Jenn.

Balm, Olymp, 1950 m, (1967)

B: im Gebirge, G: ohne Ortsangabe K i n d b e r g in Coppey

Mnium stellare Hedw.

Cardamino-Fagion, Osthang des Olymp, 960 m, 1963; Faulholz, Lailia, Serrai, 1360 m, 1924; Quercus dalechampii-Wald, Melissa, N Alexandroupolis, 560 m, (2104)

B: Gebirge, G: Giona, Parnass (C o p p e y)

Neckera complanata (Hedw.) Hueb.

Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, 1953; Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarhai und Livaderon, Drama, 400 m, 1981

B: verbreitet, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Neckera crispa Hedw.

Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, 1954

B: verbreitet, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Orthothecium intricatum (Hartm.) B. S. G.

Balm, Olymp, 1950 m, 1966

B: Pirin

Orthotrichum affine Brid. c. sp.

an *Fagus silvatica*, Stiarpa-Dokimi, Pindus, 1800 m, an *Abies cephalonica*

Mainolon, Vytina, Peloponnes, 1000 m, beide leg. H. Zoller IPE 1971

B: verbreitet, G: Taygetos (C o p p e y), an Eichen am Olymp (A d e und K o p p e)

Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl.

an *Abies cephalonica* Chrysovitsi, Peloponnes, 1100 m, leg, H. Zoller IPE 1971

B: Stara, Pirin, Stranča, G: Euboea (U n g e r in Coppey), Athos (P o d p ě - r a)

Orthotrichum pallens Brid. c. sp.

an *Fagus silvatica*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1873; Pefkoto, N Aridea, 1500 m, (1914)

B: Stara, Vitoša, Rila, Slavianka,

Orthotrichum pumilum Swartz c. sp.

an *Fagus silvatica*, Elatia, Drama, 1530 m, 2028; an *Ulmus minor*, Chrysoupolis, Kavala, 10 m, 2088

B: Samokovsko, G: Epirus (B r e i d l e r in Coppey)

Orthotrichum rupestre Schwaegr. c. sp.

Vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1600 m, 1884; Bach, ibidem, 1400 m, 1893; ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2105

B: im Gebirge, G: Ossa, Pelion (C o p p e y) Thessaloniki (P o d p ě r a)

Orthotrichum cf. stramineum Hornsch. c. sp.

an *Fagus silvatica*, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, (2093)

B: Stara, Vitoša, Samokovsko

Orthotrichum striatum Hedw. c. sp.

an *Fagus silvatica*, Osthang des Olymp, 970 m, 1964; Elatia, Drama, 1530 m, 2027; an *Quercus dalechampii*, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2071

B: verbreitet, G: Athos (P o d p ě r a)

Orthotrichum urnigerum Myrin c. sp.

Stein, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi, 870 m, 2091

B: Vitoša, G: Oeta (C o p p e y)

Oxyrrhynchium praelongum Warnst. var. *stokesii* (Turn.) Podp.

Bach, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1400 m, 1896

B: Lukovitsko, G: Ossa (C o p p e y)

Oxyrrhynchium pumilum (Wils.) Loeske

Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, 1951; Felsen, Elatia, Drama,
1360 m, 2011

B: zerstreut im Gebirge, G: Epirus (C o p p e y)

Oxystegus cylindricus (Brid.) Hilp. c. sp.

an *Pinus brutia*, Diavolorema, N Alexandroupolis, Evros, 110 m, 2108

B: Vitoša, Rila, G: Hymettos (A d e und K o p p e), an *Morus*, Kos (Z a n -
d e r)

Philonotis caespitosa Jur.

Flachmoor, Lailia, Serrai, 1450 m, 1939

B: Westrhodopen, G: Samothrake, Olymp, (A d e und K o p p e)

Philonotis fontana (Hedw.) Brid.

Bach, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1400 m, 1894; Flachmoor, Marmaro-
vrisi, Lailia, Serrai, 1360 m, 1930

B: verbreitet, G: Oita (C o p p e y)

Philonotis tomentella Mol. c. sp.

Quelliger Hang, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2063

B: Vitoša, Rila, Pirin, G: Pindus (C o p p e y)

Plagiomnium affine (Funck) Kop.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1948, Coccifero-Carpinetum, W Sta-
vros, Chalkidike, 20 m, 2111

B: verbreitet, G: Samothrake (B a u m g a r t n e r), Olymp, (leg. H a n d e l-
M a z z e t t i in K o p o n e n)

Plagiomnium ellipticum (End.) Kop. = *Mnium rugicum* Laur.

Flachmoor, Lailia, Serrai, 1360 m, 1930; 1450 m, 1941

Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop.

ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2104

B: verbreitet, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Plagiothecium curvifolium Schlieph.

Silikatblockhalde, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1550 m, 1877

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B. S. G.

Faulholz, Lailia, Serrai, 1360 m, (1924)

B: verbreitet, G: Ossa (C o p p e y), Samothrake (B a u m g a r t n e r), A d e
und K o p p e)

Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb.

Granitfelsen, Alibaba, Lailia, Serrai, 1800 m, 1972

Platygyrium repens (Brid.) B. S. G.

an *Fagus silvatica*, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1500 m, 1911

in Rumänien verbreitet (H e r z o g 1919)

Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dix.

Bach, Osthang des Olymp, 1100 m, 1869; Bach in Tilio-Castanetum, zwi-

schen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1975; ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2102; Bach, Diavolorema, N Alexandroupolis, 70 m, 2110

B: verbreitet: G: Olymp (A d e und K o p p e), Samothrake (B a u m g a r t - n e r)

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.

Pinus brutia-Wald, Diavolorema, N Alexandroupolis, Evros, 80 m, 2109; Coccifero-Quercetum, W Stavros, Chalkidike, 10 m,

B: verbreitet, G: Thessaloniki, Olymp (A d e und K o p p e)

Pleurozium schreberi Mitten

Pinus silvestris-Wald, Lailia, Serrai, 1360 m; Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m; Luzulo-Fagion, Sagradenia, Drama, 1680 m; Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m

B: Stara, Vitoša, Rila, Bjelasiza, Nord- und Zentralrhodopen

Polygonatum aloides (Hedw.) B. S. G. c. sp.

Rain, Lailia, Serrai, 1360 m, 1916

B: verbreitet, G: Pindus, Ossa (C o p p e y)

Polygonatum urnigerum (Hedw.) P. B.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1380 m, (2015)

B: verbreitet, G: Pindus (C o p p e y), Samothrake (A d e und K o p p e)

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.

Kalkschutthalde, Olymp, 2200 m, (1853)

B: im Gebirge, G: Ossa (C o p p e y), Samothrake (B a u m g a r t n e r, A d e und K o p p e)

Polytrichum juniperinum Hedw.

Silikatblockhalde, c. sp. Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1600 m, 1879; Erdrain, c. sp., Lailia, Serrai, 1360 m, (1922); Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, (1943); 1360 m, (2017)

B: verbreitet, G: Pindus (C o p p e y)

Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb.

Kalkschutthalde, Olymp, 2900 m, 1848; Galio-odorati-Fagion, ibidem, 1500 m, 1864; Stein in Andrachno-Quercetum, Thasos, 10 m, (2066)

B: verbreitet, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Pterigynandrum filiforme Hedw.

an *Fagus silvatica*, Osthang des Olymp, 970 m, 1964; Stein, ibidem (1872); an *Fagus*, Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m; (1875); Fels, Anopeternik, 1550 m, (1878); Bach, ibidem, 1400 m, (1896); an *Fagus*, Pefkoto, N Aridea, 1300 m, (1908); 1500 m, (1914); Rain, Lailia, Serrai, 1360 m, (1918); Stein, ibidem, (1937); Faulholz, ibidem, 1925; c. sp. Elatia, Drama, 1550 m, (1988); 1360 m, (2012); an *Fagus*, ibidem, 1530 m, (2028); Sagradenia, Drama, 1580 m, (2030); Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, (2094); morscher *Fagus*, ibidem, (2095)

B: verbreitet, G: Ossa (C o p p e y), Thessaloniki, Athos (P o d p ē r a), Samothrake, Olymp (A d e und K o p p e)

Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid.

Bach, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1400 m, 2121,
B: Stara, Pirin

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.

vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Voras, Pella, 1600 m, 1879;
feuchter Fichtenwald, Elatia, Drama, 1550 m, 1989
B: verbreitet, G: Ossa (C o p p e y)

Rhizomnium punctatum (Hedw.) Kop.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1360 m, 2122,
B: verbreitet, G: Pindus (C o p p e y)

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. c. sp.

feuchtes Piceetum, Elatia, Drama, 1360 m, 2017
B: im Gebirge

Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.

Kalkfels in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, (1981); Stein in Andrachno-Quercetum, Thasos, 10 m, 2066;
B: im Gebirge zerstreut, G: Kos (B a u m g a r t n e r)

Rhynchostegium confertum (Dicks.) B. S. G.

Stein in Andrachno-Quercetum, Thasos, 10 m, 2067
B: Zentralrhodopen, G: Syros (K i n d b e r g i n Coppey)

Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.

feuchtes Piceetum, Elatia, Drama, 1360 m, 2117,
B: Stara, Vitoša, Rila, Pirin, Westrhodopen, G: Samothrake (B a u m -
g a r t n e r)

Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

Fichtenwald, Elatia, Drama, 1360 m, 2019
B: im Gebirge, G: Samothrake (B a u m g a r t n e r, A d e und K o p p e)

Schistidium apocarpum (Hedw.) B. S. G.

Stein in Galio-odorati-Fagion, c. sp. Osthang des Olymp, 1500 m, (1862); c. sp. ibidem, 1800 m, 1858; Kryovrissi, NW Aridea, Pella, 1030 m, 1881; in Tilio-Castanetum zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1979
B: verbreitet, G: Saloniki, Athos (P o d p ē r a)

Scleropodium touretii (Brid.) L. J. Koch

Pinus brutia-Wald, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2046, Coccifero-Quercetum, W Stavros, Chalkidike, 10 m
B: Südteil des Pirin, Bjelasiza, G: Euboea (F r o e h l i c h)

Sphagnum palustre L.

Flachmoor, Lailia, Serrai, 1450 m, 1938,
B: Stara, Vitoša, Westrhodopen

Sphagnum subsecundum Nees

Flachmoor, Lailia, Serrai, 1450 m, (1938)
B: Stara, Vitoša, Rila, Pirin, Westrhodopen

Syntrichia laevipila Brid.

an *Quercus pedunculiflora*, Chrysoupolis, Kavala, 10 m, 2086
B: Rila, G: Korfu, Lefkas (B o r n m ü l l e r)

Syntrichia pulvinata Jur.

an *Fagus silvatica*, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2093
B: Rila, G: Kriti (G r a d s t e i n)

Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr

Kalkschutt, Olymp, 2900 m, (1848); Vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella, 1550 m, (1877); an *Fagus silvatica*, c. sp. Pefkoto, N Aridea, 1300 m, (1909); morsche Buche, Mavri Petra, N Stavroupolis, Drama, 1400 m, 2096
B: verbreitet, G: Olymp (A d e und K o p p e)

Syntrichia subulata (Hedw.) Web. et Mohr c. sp.

Cardamino-Fagion, Osthang des Olymp, 960 m, 1962
B: verbreitet, G: Pelion (C o p p e y), Korthiathi, Athos (P o d p ē r a)

Tetraphis pellucida Hedw.

Piceafaulholz, Elatia, Drama, 1550 m; 1360 m,
B: Stara, Vitoša, Rila, Pirin, Nord- und Zentralrhodopen

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl.

Lunario-Acerion, Osthang des Olymp, 600 m, 1955; ausgetrockneter Bach, Melissa, N Alexandroupolis, Evros, 560 m, 2102
B: verbreitet, G: Akarnanien (C o p p e y)

Tortella flavovirens (Bruch) Broth. c. sp.

Rain, Osthang des Olymp 690 m, 1961, Ipsarion oros, Thasos, 700 m, 2047
B: Zentralrhodopen, Stranča, G: Kerkyra (U n g e r in Coppey), Athen (G e h e e b in Coppey)

Tortella nitida (Lindb.) Broth.

Vulkanischer Fels, Anopeternik, NW Aridea, Pella 1580 m, 1883; Silikat-block in *Quercus dalechampii*-Wald, Kallithea, N Stavroupolis, Xanthi 870 m, 2090
B: Varna, G: Athos (P o d p ē r a), Samothrake (B a u m g a r t n e r, A d e und K o p p e)

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

Kalkschutthalde, Olymp, 2900 m (1848); Kalkfels in Tilio-Castanetum, zwischen Taxiarchai und Livaderon, Drama, 400 m, 1981
B: verbreitet, G: Athos (P o d p ē r a), Samothrake (B a u m g a r t n e r)

Trichostomum crispulum Bruch c.sp.

Trockenhang, Pefkoto, N Aridea, Pella, 1330 m, 1897
B: Stara, Pirin, Rodopite, Stranča, G: Athos (P o d p ē r a)

Z u s a m m e n f a s s u n g

In einem Verzeichnis werden die Moos- und Flechtenfunde von einer Exkursion auf den Olymp, ins Vorasgebirge und in die Rhodopen zusammengestellt und mit Literaturangaben aus Bulgarien und Griechenland verglichen. Dabei erweisen sich 44 Arten wohl als neu für Griechenland

S u m m a r y

A list of the lichens and bryophytes collected during the excursion of the Botanical Institute of the University of Basle to Mt. Olympos, Voras Mts. and Rhodope Mts. is given and compared with reports from Bulgaria and Greece. 44 species are apparently new to Greece.

R e s u m é

Une liste de lichens et de bryophytes récoltés pendant l'excursion de l'Institut de Botanique de l'Université de Bâle à l'Olympe et aux chaînes du Voras et des Rhodopes est donnée et comparé à la répartition en Bulgarie et en Grèce. 44 espèces ont été trouvées apparemment pour la première fois en Grèce.

L i t e r a t u r

- 1955 A d e , A. und K o p p e , F.: Moose aus dem Balkan, aus Südalien und von den ägäischen Inseln.
Acta Mus. Maced. Sci. Nat. 2, 1—16.
- 1943 B a u m g a r t n e r , J.: Bryophyta, in Rechinger K. H., Flora aegaea. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 105/1, 59—72.
- 1943 — Bryophyta, in Rechinger K. H., Neue Beiträge zur Flora von Kreta. ibid, 105/2, 48—58.
- 1928 B o r n m ü l l e r , J.: Musci und Hepatici in: Ergebnisse einer botanischen Reise nach Griechenland im Jahre 1926. Feddes Repert. sp. nov. XXV, 336—347.
- 1907 C o p p e y , A.: Contribution à l'étude des muscinées de la Grèce. Bull. Soc. Sci. Nancy, sér. 3, 8, 293—360.
- 1909 — Deuxième contribution à l'étude des Muscinées de la Grèce. ibid. sér. 3, 10, 83—130.
- 1974 C r u n d w e l l , A. C. and N y h o l m , E.: Funaria muhlenbergii and related European species. Lindbergia 2, 3—4, 222—229.
- 1966 D ü l l , R.: Moosflora und -vegetation auf Kreta. Rev. bryol. et lichenol. 34, 732—761.
- 1961 F r o e h l i c h , J.: Bryophyten, in: Rechinger K. H., Die Flora von Euboea. Bot. Jahrb. Syst. 80, 455—459.
- 1970 G r a d s t e i n S. R.: New or otherwise interesting bryophytes from Crete. Rev. bryol. et lichenol. 37, 663—679.
- 1909 H a r m a n d , J. et M a i r e , R.: Contribution à l'étude des lichens de la Grèce. Bull. Soc. Sci. Nancy, sér. 3, 10, 143—176.
- 1919 H e r z o g , T. h.: Beiträge zur Bryogeographie Südosteuropas, I Mazedonien. Kryptogamenforschung, Bayr. Bot. Ges. 4, 274—298.
- 1861 J u r a t z k a , J. et G o t t s c h e , C. M.: Specimen florae cryptogame septem insularum editum juxta plantas Mazzarianas herbarii Heuflerian. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XI, 413—416.

- 1971 Koponen, T.: A monograph of *Plagiomnium* sect. *Rosulata*. *Ann. Bot. Fenn.* 8, 305—367.
- 1924 Meylan, C.: Les Hépatiques de la Suisse. *Beitr. Krypt. flora Schweiz*, VI, 1, 318 S.
- 1975 Petrov, S. P.: Opredelitel na mchovete v Blgarija. Sofia, 536 S.
- 1911 Podpera, J.: Ein Beitrag zur Moosflora der bulgarischen Hochgebirge. *Beih. Bot. Cbl. XXVIII*, 2, 173—224.
- 1922 — Ad *Bryophytorum Haemi peninsulae cognitionem additamentum*. *Acta bot. bohemica* I, 5—25.
- 1919 Schiffner, V. und Baumgartner, J.: Beiträge zur Kenntnis der Flora Griechenlands. B. Leber- und Laubmoose. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 69, 313—341.
- 1898 Steiner, J.: Prodromus einer Flechtenflora des griechischen Festlandes. *Sitz ber. K. u. K. Akad. Wiss. Math.-Naturwiss. Kl. CVII*, I, 103—159.
- 1919 — Beiträge zur Kenntnis der Flora Griechenlands, C. Lichenes. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 69, 52—101.
- 1943 Szatala, O. e.: Lichenes, in Rechinger K. H., *Flora aegaea*. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl.* 105, 1, 16—58.
- 1943 — Lichenes in Rechinger K. H., Neue Beiträge zur Flora von Kreta. *ibidem*, 105, 2, 27—47.
- 1976 Walter, E.: Einige Beobachtungen an Flechten während der 15. IPE in Griechenland. Veröff. Geobot. Inst. Rübel, 56, 87—91.
- 1974 Zander, R. H.: Some pottiaceous mosses from the Aegean islands of Greece. *Ann. Mus. Goulandris, Kifissia*, 2, 83—87.
- 1977 Zölle, H., Geissler, P. und Athanasiadis, N.: Beiträge zur Kenntnis der Wälder, Moos- und Flechtenvegetation in den Gebirgen Nordgriechenlands. *Bauhinia* 6 (215—255).

Adresse der Autorin: Dr. P. Geissler, Conservatoire et jardin botaniques, Case postale 60, 1292 Chambésy/Genève.